

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБІЦИД



АКЛОНІК

СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД
ПРОТИ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ
У ПОСІВАХ СОНЯШНИКА



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

аклоніфен – 600 г/л

Хімічна група: Дифенілефіри

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Сприяє накопиченню у рослині фітону, який інгібує синтез хлорофілу та інших фотосинтетично активних пігментів, у результаті чого припиняється ріст молодих бур'янів і через 2–3 тижні вони гинуть

Бур'ян	Ефективність
Вероніка (види)	• • •
Гірчак звичайний	• • •
Гірчиця дика	• • •
Грицики звичайні	• • •
Жовтозілля звичайне	• • •
Жовтушник (види)	• • •
Зірочник	• • •
Кучерявець Софії	• • •
Лобода (види)	• • •
Мак дикий	• • •
Підмаренник чіпкий	• • •
Редька дика	• • •
Рутка лікарська	• • •
Талабан польовий	• • •
Ріпакова падалиця	• • •

Бур'ян	Ефективність
Гірчак березковидний	• •
Канатник Теофраста	• •
Куряче просо	• •
Мишій (види)	• •
Осот жовтий	• •
Ромашка (види)	• •
Росичка	• •
Щириця (види)	• •
Амброзія полинолиста	•
Берізка польова	•
Вівсюг звичайний	•
Дурман	•
Нетреба звичайна	•
Паслін чорний	•
Циклахена нетреболиста	•
Зернова падалиця	•

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні - +15...+25°C
- Рекомендовано використовувати в умовах активного сонячного випромінювання
- Рекомендоване внесення на дрібно-грудкувату поверхню ґрунту для оптимального розподілу продукту по поверхні і утворення захисного екрану
- Не рекомендований до використання у суміші з іншими продуктами (пестицидами, мікродобривами, сурфактантами)

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Посів – поява сходів	3 – 6 л/га	1
	2–4 справжніх листків культури	1 – 2 л/га	1
Морква	Посів – поява сходів	4 л/га	1
Цибуля	2–4 листки культури (з інтервалом 12–14 діб)	0,5 л/га	2