


НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ФУНГІЦИД



АЗОСТАР

ПРОДУКТ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ
ХВОРОБ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ,
РІПАКУ, СОЇ І СОНЯШНИКА



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

азоксистробін – 200 г/л

ципроконазол – 80 г/л

Хімічна група: Триазоли, стробілурини

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має відмінну профілактичну і лікувальну дію проти широкого спектру патогенів
- Високоєфективний проти іржастих хвороб
- Забезпечує тривалий період захисту культури
- Продовжує тривалість вегетації, завдяки чому збільшується врожайність культури

Культура	Хвороба	Ефективність
Ячмінь	Гельмінтоспоріоз	● ● ● ●
	Ринхоспоріоз	● ● ●
	Борошниста роса	●
Пшениця	Жовта іржа, бура іржа, піренофороз	● ● ●
	Фузаріозна пліснява	● ●
	Септоріоз	● ● (●)
	Борошниста роса	●
Ріпак	Альтернаріоз	● ● ●
	Сіра гниль (ботрітіс), фомоз, склеротинія	● ●
	Несправжня борошниста роса	● (●)
Соняшник	Іржа, септоріоз	● ● ● ●
	Альтернаріоз, фомоз, фомопсис (сіра плямистість)	● ●
Соя	Альтернаріоз, склеротиніоз	● ●
	Несправжня борошниста роса	● (●)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні – +12...+25°C
- Найкраще проводити обробку вранці або ввечері у безвітряну погоду
- Не рекомендовано застосовувати, коли очікуються приморозки, тривала посуха чи спекотна погода

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Обприскування під час вегетації за появи перших ознак хвороби	0,5 – 0,75 л/га	2
Ячмінь	Обприскування під час вегетації за появи перших ознак хвороби	0,5 – 0,75 л/га	2
Ріпак	Обприскування під час вегетації за появи перших ознак хвороби	0,75 – 1 л/га	2
Соя	Обприскування під час вегетації за появи перших ознак хвороби	0,5 – 0,75 л/га	2
Соняшник	Обприскування під час вегетації за появи перших ознак хвороби	0,5 – 1 л/га	2