

РІДКЕ ЛИСТОВЕ ДОБРИВО

FERTEQ



БОРОНІАФОС

ЗБАЛАНСОВАНА КОМБІНАЦІЯ
БОРУ І ФОСФОРУ
В ОДНІЙ КАНІСТРІ



ТАРА: 10 л

Склад:

Бор (В) – 120 г/л

Фосфор (P_2O_5) – 100 г/л

рН продукта: 8

Густина продукта: 1,5



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Завдяки бору і фосфору – ключовим мікроелементам для поділу клітин, гарантує відмінну вегетацію і високу фертильність ґрунту
- Покращує ріст і розвиток кореневої системи
- Посилює стійкість рослини до низьких температур
- Оптимізовує формування врожаю ще з осені



ПОЄДНАННЯ ФОСФОРУ І БОРУ

Бор та фосфор є елементами, які діють у синергії протягом циклу розвитку рослини і мають вплив як на врожайність, так і на якість культури.

В БОР

- Відіграє важливу роль у процесах запилення і формування врожаю
- Забезпечує ріст кореневої системи для кращого поглинання вологи і поживних речовин
- Покращує жорсткість клітинних стінок (морозостійкість) та використання вологи (посуhostійкість)

Р ФОСФОР

- Стимулює ріст коренів і засвоєння поживних речовин
- Забезпечує підвищену стійкість до захворювань і низьких температур
- Сприяє жорсткості тканин і стійкості до вилягання
- Активує поділ клітин

ПРОДУКТ МІСТИТЬ ПОЛІОЛИ

Високоякісна формуляція добрива включає полііоли – технологічні добавки і допоміжні речовини 100% рослинного походження, які покращують засвоєння фосфору і бору.

КРАЩЕ ПРОНИКНЕННЯ

Завдяки малому розміру полііол, поживні речовини легше і швидше проникають крізь мембрани рослин.


КРАЩА ДОСТУПНІСТЬ

Полііоли містять змочувальні агенти, які запобігають випаровуванню крапель, у результаті чого поживні речовини стають довше доступними для рослини.


КРАЩИЙ РОЗПОДІЛ

Полііоли розподіляють поживні речовини по всій рослині для швидшого і кращого ефекту від живлення.

Розмір полііол у порівнянні з іншими молекулами, які використовуються у листових добривах



Порівняння розтікання по листку краплі звичайного борвмісного продукту і БорфоСТАРТ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Норма витрати
Бобові	Від 10–12 см рослини (фаза BBCH 15) до появи квіткових бутонів (фаза BBCH 51)	1 – 3 л/га
Соняшник	BBCH 15–18	1 – 3 л/га
Ріпак	<u>Восени</u> : у фазі розетки (BBCH 15) <u>Весною</u> : починаючи з відновлення вегетації (фаза BBCH 30) до з'єднаних бруньок (фаза BBCH 55)	1 – 3 л/га
Цукровий буряк	1 внесення: у фазі BBCH 39 2 внесення: протягом 3х тижнів від фази BBCH 39	1 – 3 л/га