

РЕГУЛЯТОР РОСТУ



КОНТРОЛЬ ВЕГЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ

БРЕЙКЕР Турбо

МОРФО-РЕГУЛЯТОР
З ФУНГІЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ РОСТУ РІПАКУ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

мепікват-хлорид – 210 г/л

метконазол – 30 г/л


Хімічна група: Сполуки четвертинного амонію,
триазоли

Формуляція: Розчинний концентрат (РК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Впливає на процеси біосинтезу гіберелінів, у результаті чого запобігає передчасному й надмірному росту посівів ріпаку у висоту
- Сприяє розвитку кореневої системи та покращує перезимівлю культури
- Пригнічує біосинтез ергостеролу у клітинах грибів-патогенів, завдяки чому грибок не може формувати клітинні мембрани
- Дозволяє контролювати хвороби ріпаку – гниль кореневої шийки і стебла та альтернаріоз

ТЕМПЕРАТУРА ВНЕСЕННЯ РІЗНИХ РЕГУЛЯТОРІВ:



Вибір та внесення регулятора залежить від кількості опадів, часу відновлення весняної вегетації, сорту, попередника, використання добрив і температури повітря. Для кращої стійкості до вилягання рослина повинна бути оптимально забезпечена поживними речовинами: фосфором, калієм, бором, міддю, марганцем тощо. Використання регуляторів росту за стресових умов **ЗАБОРОНЕНО!**

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні – від +5 до +35°C
- Норма витрати робочого розчину – 100 - 300 л/га
- Не рекомендовано використовувати з водою, температурою нижче +10°C для уникнення зниження розчинності
- Не рекомендовано застосовувати пізніше, ніж за 50 діб до початку збору врожаю ріпаку
- За необхідності може використовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність та фіто-токсичність відносно культури

Культура	Призначення	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Ріпак озимий	Запобігання переростанню та покращення перезимівлі культури	Восени: у фазі 4-6 листків	0,7 – 1,4 л/га	2
	Проти вилягання і для оптимізації середовища вирощування	Навесні: за висоти рослини 20-30 см	0,7 – 1,4 л/га	
	Для боротьби з фомозом і альтернаріозом	Обприскування під час вегетації	0,7 – 1,4 л/га	
Ріпак ярий	Запобігання переростанню, вилягання і для оптимізації середовища вирощування	За висоти рослин 20-30 см	0,7 – 1,4 л/га	2
	Для боротьби з фомозом і альтернаріозом	Обприскування під час вегетації	0,7 – 1,4 л/га	