


НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ФУНГІЦИД



# ДЕРОЗИМ

СИСТЕМНИЙ ПРОДУКТ  
ДЛЯ ЗАХИСТУ КУЛЬТУР  
ТА ОБРОБКИ НАСІННЯ



ТАРА: 5 л

**Діюча речовина:**

**карбендазим – 500 г/л**

**Хімічна група:** Бензімідазоли

**Формуляція:** Концентрат суспензії (КС)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має широкий спектр профілактичної і лікувальної дії проти хвороб, що передаються через насіння і ґрунт
- Високо-ефективний на початкових етапах зараження
- Забезпечує тривалий період захисту насіння і сходів
- Не має фітотоксичності і безпечний для довкілля

### КАРБЕНДАЗИМ

- Інгібує процес мітозу у клітинах патогенів, порушуючи їх поділ
- У клітинах грибів – зупиняє ріст міцелію і затримує проростання спор

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Вносити під час вегетації культур профілактично та за перших ознак прояву хвороби
- Оптимальна температура внесення – від +10 до +25°C (нижня межа +8°C), швидкість вітру – не більше 5 м/с, у ранкові або вечірні години
- Не рекомендовано застосовувати, коли культури перебувають у стресовому стані, при перепадах денних і нічних температур, або напередодні приморозків чи посухи
- Не рекомендовано змішувати з пестицидами, що мають лужне середовище
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

### ОБПРИСКУВАННЯ В ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ

| Культура                         | Хвороба                                        | Норма витрати  | Максимальна кратність обробок |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Пшениця                          | Снігова пліснява, септоріоз                    | 0,4 – 0,5 л/га | 2                             |
| Ячмінь                           | Гельмінтоспоріоз                               | 0,4 – 0,5 л/га | 2                             |
| Жито озиме                       | Види іржі                                      | 0,4 – 0,5 л/га | 2                             |
| Ріпак                            | Альтернاریоз, фомоз                            | 0,5 – 1 л/га   | 2                             |
| Цукровий буряк<br>Кормовий буряк | Церкоспороз, борошниста роса                   | 0,3 – 0,4 л/га | 2                             |
| *Соя                             | Борошниста роса, антракноз                     | 0,5 л/га       | 1                             |
| *Соняшник                        | Сіра гниль, біла гниль, фомоз, борошниста роса | 0,5 – 1 л/га   | 1                             |

\* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури

### ОБРОБКА НАСІННЯ

| Культура | Хвороба                                                  | Норма витрати | Максимальна кратність обробок |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Пшениця  | Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби        | 1 – 1,2 л/т   | 1                             |
| Ячмінь   | Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби        | 1 – 1,2 л/т   | 1                             |
| Соняшник | Біла гниль, сіра гниль, фомоз, пліснява, борошниста роса | 0,8 л/т       | 1                             |