

## ІНСЕКТИЦИД



# ДІАБЛО

ІНСЕКТО-АКАРИЦИД  
КОНТАКТНО-КИШКОВОЇ ДІЇ



**ТАРА:** 1 л

**Діюча речовина:**

**біфентрин** – 100 г/л

**Хімічна група:** Піретроїди

**Формуляція:** Концентрат емульсії (КЕ)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має яскраво виражений репелентний ефект
- Стійкий до змивання дощем
- Ефективний на всіх стадіях розвитку комах
- Діє відразу після обробки і має виражену пролонговану дію
- Високоєфективний проти абсолютної більшості комах-шкідників, у т.ч. павутинного кліща
- Має широкий спектр дії і дозволяє використовувати низьку норму витрати
- Безпечний для сільськогосподарських культур

### БІФЕНТРИН

- Діє на шкідливі організми контактно і кишково
- Як і інші піретроїди – впливає на нервову систему
- Ефективно діє на всі інші стадії розвитку комах: яйця, гусінь (німфи) та імаго
- Симптоми ураження – сильне збудження шкідника з подальшим паралічем

| Культура     | Шкідник                                                        | Норма витрати     | Максимальна кратність обробок |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Соя          | Акацієва вогнівка, совки, кліщі                                | 0,2 – 0,3 л/га    | 2                             |
| Яблуня       | Яблунева плодожерка, мінуєчі молі, листовійки, попелиці, кліщі | 0,4 – 0,5 л/га    | 2                             |
| Виноградники | Кліщі                                                          | 0,125 – 0,15 л/га | 2                             |



Павутинний кліщ



Чортополохівка (реп'яшниця)



Пшеничний трипс



Хрестоцвіті блішки



Озима совка



Попелиця зелена яблунева

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Використовувати для обприскування культур при появі шкідників протягом періоду вегетації
- Максимальна ефективність препарату досягається за умови обробки у вечірні або ранкові години при температурі повітря від +15 до +22°C
- Для досягнення рівномірного та достатнього обприскування надземної частини культури рекомендовано додавати адювант рНАД у нормі 0,2-0,4 л/га
- Рекомендовано використовувати дрібно-крапельні форсунки
- Препарат сумісний з багатьма речовинами, крім лужних
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

| Культура        | Фаза внесення | Норма витрати    |
|-----------------|---------------|------------------|
| *Пшениця        | ВВСН 21–69    | 0,25 – 0,4 л/га  |
| *Ячмінь         | ВВСН 21–69    | 0,2 – 0,3 л/га   |
| *Ріпак          | ВВСН 12–69    | 0,2 – 0,3 л/га   |
| *Соняшник       | ВВСН 10–79    | 0,15 – 0,25 л/га |
| *Кукурудза      | ВВСН 12–71    | 0,15 – 0,25 л/га |
| *Соя            | ВВСН 12–81    | 0,2 – 0,4 л/га   |
| *Цукровий буряк | ВВСН 18–49    | 0,2 – 0,4 л/га   |
| *Горох          | ВВСН 12–89    | 0,2 – 0,4 л/га   |

\* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.