

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



ЕКСТРАПРИМ

СИСТЕМНИЙ ВИБІРКОВО-ДІЮЧИЙ
ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБИЦИД



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

**2,4-дихлорфеноксиоцтова
кислота 2-етилгексилового ефіру** – 452,42 г/л
флорасулам – 6,25 г/л

Хімічна група: Похідні арилоксиалкарбонової кислоти
Триазолпіримідини

Формуляція: Суспензійна емульсія (СЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має широкий спектр дії проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів, у т.ч. стійких до 2,4 Д
- Дозволяє широке технологічне вікно застосування – аж до другого міжвузля на зернових
- Контролює усі види падалиці ріпаку і соняшника
- Швидко проникає навіть через восковий наліт і дуже швидко діє на бур'янах
- Пригнічує перерослі бур'яни
- Запобігає виникненню резистентності завдяки різному механізму двох діючих речовин: 2-етилгексильовий ефір 2,4-Д викликає реакцію ауксинового типу, а флорасулам є інгібітором утворення ферменту ацетолактатсинтази
- Не має післядії і є безпечним для наступних культур у сівозміні

Бур'ян	Ефективність
Волошка	● ● ●
Зірочник	● ● ●
Лобода	● ● ●
Мак польовий	● ● ●
Підмаренник чіпкий	● ● ●
Ромашка	● ● ●
Хрестоцвіті	● ● ●
Щириця	● ● ●

Бур'ян	Ефективність
Яснотка	● ● ●
Падалиця соняшника	● ● ●
Падалиця ріпаку	● ● ●
Осот	● ● (●)
Гірчак	● ● ●
Берізка польова	● (●)
Вероніка	● ●
Волосняк розсічений	● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Найкраща ефективність продукту досягається за умови використання у фазі інтенсивного росту бур'янів:
 - **однорічні дводольні** – 3–5 листків
 - **багаторічні коренепаросткові** – починаючи від фази розетки до початку стеблуння
- Оптимальна температура повітря при внесенні +8...+25°C
- Не рекомендовано проводити обробку перед і після нічних приморозків
- Для досягнення рівномірного і достатнього обприскування рекомендованого додавати адювант **рНАД у нормі 0,2 – 0,4 л/га**

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Від початку фази кушення до утворення другого міжвузля	0,4 – 0,6 л/га	1
Ячмінь ярий та озимий	Від початку фази кушення до утворення другого міжвузля	0,4 – 0,6 л/га	1
Кукурудза	У фазі від 3 до 5 листків	0,4 – 0,6 л/га	1



Класифікація ВООЗ, токсичність: 3 клас (високостійкий у воді). Шкідливий при проковтуванні. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Спричиняє серйозне пошкодження очей. Дуже токсичний для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Для уникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.