

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБІЦИД



# ФАКСИМІЛ

СИСТЕМНИЙ ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦИД  
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ОДНОРІЧНИХ  
ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ТАРА: 1 л

Діюча речовина:

**флорасулам** – 50 г/л

Хімічна група: Триазолпіримідини

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Забезпечує контроль підмаренника чіпкого
- Знищує усі види падалиці соняшника, у т.ч. стійкого до трибенурон-метилу та імідазолінонів
- Придатний для внесення восени
- Не проявляє фіто-токсичності
- Не має обмежень у сівозміні

### ФЛОРАСУЛАМ

- Пригнічує фермент ацетолаттатсинтази, чим блокує утворення амінокислот – валіну, ізолейцину і лейцину. У результаті цього через кілька годин припиняється поділ клітин, ріст пагонів і кореневої системи бур'янів.

| Бур'ян                   | Ефективність | Бур'ян                                          | Ефективність |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Амброзія полинолиста     | ● ● ●        | Підмаренник чіпкий                              | ● ● ●        |
| Волошка синя             | ● ● ●        | Редька дика                                     | ● ● ●        |
| Галінсога дрібноквіткова | ● ● ●        | Ромашка (види)                                  | ● ● ●        |
| Гірчак (види)            | ● ● ●        | Сокирки польові                                 | ● ● ●        |
| Гірчиця польова          | ● ● ●        | Талабан польовий                                | ● ● ●        |
| Грицики звичайні         | ● ● ●        | Щириця (види)                                   | ● ● ●        |
| Кульбаба лікарська       | ● ● ●        | Жабрій звичайний                                | ● ●          |
| Кучерявець Софії         | ● ● ●        | Зірочник середній                               | ● ●          |
| Мак дикий                | ● ● ●        | Кропива глуха                                   | ● ●          |
| Осот городній            | ● ● ●        | Падалиця ріпаку<br>(стійкого до імідазолінонів) | ● ●          |
| Осот жовтий              | ● ● ●        | Рутка лікарська                                 | ● ●          |
| Падалиця соняшника       | ● ● ●        |                                                 |              |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні - від +12 до +25°C
- Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18-22 год.)
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

| Культура  | Фаза внесення                                                                                                 | Норма витрати      | Максимальна кратність обробок |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Пшениця   | Від фази 3-х листків до появи прапорцевого листка культури і на ранніх стадіях розвитку бур'янів (2–4 листки) | 0,075 – 0,125 л/га | 1                             |
| Ячмінь    | Від фази 3-х листків до появи прапорцевого листка культури і на ранніх стадіях розвитку бур'янів (2–4 листки) | 0,075 – 0,125 л/га | 1                             |
| Кукурудза | Від фази 3-6 листків культури і на ранніх стадіях розвитку бур'янів (2–4 листки)                              | 0,075 – 0,125 л/га | 1                             |