

ГЕРБІЦИД



ФІНІШЕР

ДЕСИКАНТ КОНТАКТНОЇ СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ,
ГЕРБІЦИД ДЛЯ ПІДСУШУВАННЯ КУЛЬТУР
І ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ



ТАРА: 20 л

Діюча речовина:

дикват дибромід – 200 г/л

Хімічна група: Похідні речовини дипіридилію

Формуляція: Розчинний концентрат (РК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Діюча речовина десиканта руйнує мембрани клітин і цитоплазми, що призводить до зневоднення та повного висихання рослини
- Продукт полегшує планування жнив і збирання врожаю сільськогосподарських культур, завдяки підсушуванню бур'янів, що продовжують розвиватися
- Не змивається дощем
- Забезпечує рівномірне дозрівання основної культури і сприяє зменшенню витрат при збиранні
- Завдяки швидкому розпаду всередині рослини не впливає на посівні якості – можна використовувати на насіннєвих посівах

Ураження посівів Білою гниллю – склеротиніозом (*Sclerotica sclerotiorum*) та Сірою гниллю (*Botrytis cinerea*) може призвести до зниження врожайності соняшника на 10–20%, а також негативно вплинути на якість насіння, кислотне число та вміст олії. Крім того, соняшник стане вразливим і під час дощу та вітрів – може зламатися і вилягти.



Оскільки висихання соняшника є повільним і нерівномірним – десикація посівів сприятиме прискоренню процесу висихання і дасть можливість зменшити втрати врожайності:

- Зупинити розвиток хвороб, які безпосередньо впливають на кислотне число соняшника,
- Зупинити процес гниття і опадання кошиків,
- Зменшити кількість падалиці соняшника, яка є великою проблемою для наступної культури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Не рекомендований до використання у бакових сумішах з іншими пестицидами через не співпадіння термінів застосування
- Для кращого поглинання рослиною можна поєднувати з селітрою або карбамідом
- Для досягнення максимальної ефективності обробку проводити ввечері, або у хмарну погоду до того, як на рослини почне світити сонце (з метою уникнення фіто-токсичності і швидкого випаровування)

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Обприскування у фазі початку побуріння кошиків	2 – 3 л/га	1
Ріпак ярий та озимий	Обприскування при побурінні 70% стручків	2 – 3 л/га	1
*Соя	Обприскування при побурінні бобів нижнього і середнього ярусів	2 – 3 л/га	1

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури