

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



ГЕРБИГОЛД

ПРОДУКТ ПРОТИ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ
І ПРАКТИЧНО ВСІХ
ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ТАРА: 20 л

Діюча речовина:

тербутилазин – 187,5 г/л

S-метолахлор – 312,5 г/л

Хімічна група: Хлорацетаміди, триазини

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Забезпечує контроль широкого спектру однорічних злакових і дводольних бур'янів
- Дає можливість проводити захисну обробку посівів кукурудзи після сходів (до 3 листків)
- Має тривалий період захисної дії (до 8 тижнів)
- Не має післядії і фітотоксичності (порівняно з іншими гербіцидами на основі ацетохлору)
- Не викликає резистентності бур'янів
- Повністю розкладається у ґрунті і не має обмежень у сівозміні на наступний сезон

Бур'ян	Ефективність
Вівсюг	● ● ●
Куряче просо	● ● ●
Мишій сизий	● ● ●
Росичка	● ● ●
Зернова падалиця	● ● ●
Вероніка	● ● ○
Гірчак березковидний	● ● ○

Бур'ян	Ефективність
Гірчак звичайний	● ● ○
Лобода	● ● ○
Паслін чорний	● ● ○
Переліска однорічна	● ● ○
Підмаренник чіпкий	● ● ○
Ромашка	● ● ○
Щириця звичайна	● ● ○
Ріпакова падалиця	● ● ○

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- При післясходовому внесенні на кукурудзі фаза розвитку бур'янів не повинна перевищувати 2 справжніх листки
- На легких (мало-гумусних) ґрунтах рекомендовано зменшувати норму внесення на соняшнику до 3 л/га
- Не рекомендовано вносити, якщо очікуються заморозки протягом 2–3 днів
- У випадку надмірних опадів рослини можуть бути пошкоджені гербіцидом унаслідок їх підтоплення водою, або відскакування крапель дощу від ґрунту разом із препаратом
- У випадку недостатньої кількості вологи у ґрунті на момент внесення, допускається допосівна заробка у ґрунт на глибину не більше 5 см
- Ефективність продукту знижується у випадку використання під час несприятливих умов – приморозки, посухи, високі температури
- Максимальна ефективність продукту досягається за наявності достатніх запасів ґрунтової вологи, або опадів щонайменше у кількості 10–20 мм протягом 2 тижнів з моменту внесення
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Посів – до сходів культури, або у фазі до 3 листків	3,5 – 4,5 л/га	1
Соняшник	До посіву, під час або після посіву (але до появи сходів культури!)	3 – 4,5 л/га	1

