

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБІЦИД



КАРМА Екстра

СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД-ДЕСИКАНТ
НЕСЕЛЕКТИВНОЇ ДІЇ



ПАРА: 20 л

Діюча речовина:

гліфосату калійна сіль – 663 г/л

Хімічна група: Гліцини

Формуляція: Розчинний концентрат (РК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Забезпечує прискорене поглинання розчину за рахунок високої концентрації діючої речовини та високоякісної формуляції
- Має суцільну дію і дозволяє надійно контролювати однорічні і багаторічні бур'яни
- Дозволяє проводити обробку за температури від +5 до +25°C



Прозорий продукт

У виробництві КАРМА Екстра не використовуються барвники, які зазвичай додають до пестицидів з метою приховування їх неоднорідності.

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Вівсюг звичайний	• • •	Ромашка (види)	• • •	Осот рожевий	• •
Волошка синя	• • •	Сокирки польові	• • •	Осот шорсткий	• •
Гірчиця польова	• • •	Стоколос польовий	• • •	Падалиця ріпаку	• •
Грицики звичайні	• • •	Талабан польовий	• • •	Підмаренник чіпкий	• •
Гумай	• • •	Цикорій звичайний	• • •	Повитиця (види)	• •
Жовтець (види)	• • •	Шпергель польовий	• • •	Подорожник великий	• •
Зірочник середній	• • •	Щириця (види)	• • •	Полин гіркий	• •
Кучерявець Софії	• • •	Амброзія полинолиста	• •	Суріпиця звичайна	• •
Лобода біла	• • •	Гірчак (види)	• •	Чина бульбиста	• •
Метлюг	• • •	Деревій звичайний	• •	Берізка польова	•
Мишій (види)	• • •	Дурман звичайний	• •	Ваточник сирійський	•
Нетреба колюча	• • •	Канатник Теофраста	• •	Очерет звичайний	•
Падалиця пшениці	• • •	Кульбаба лікарська	• •	Перстач гусячий	•
Пирій повзучий	• • •	Лопух великий	• •	Свинорій пальчастий	•
Півняче просо	• • •	Молочай верболистий	• •		

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальні умови внесення: вологість повітря: +/- 70%, температура повітря: від +10.....+22°C
- Для досягнення рівномірного та достатнього обприскування рекомендовано знижувати рН робочого розчину шляхом додавання адюванта рНАД у нормі 0,1–0,3 л/га, залежно від норми витрати робочого розчину:
 - оптимальна норма вливу – до 100 л/га (можливе дрібно-крапельне внесення за допомогою дрона)
 - оптимальний рівень рН води – 4,5–6
- Можна змішувати з ацетохлором, мезотріоном, метолахлором, 2,4-Д, МЦПА, тербутилазином і сульфатом амонію
- Перед використанням у бакових сумішах обов'язково перевіряти продукти на сумісність

Культура	Мета обробки	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Ріпак	Десикація	Фізіологічне дозрівання культури при побурінні 70% стручків	2 – 3 л/га	1
Соняшник	Десикація	Початок побуріння кошиків	2 – 3 л/га	1
Кукурудза	Десикація	За 2 тижні до збору врожаю при вологості зерна не більше 30%	2 – 3 л/га	1
*Соя (не ГМО)	Десикація	За 2 тижні до збору врожаю у фазі початку побуріння зернин нижніх і середніх ярусів	2 – 3 л/га	1

* Світовий досвід використання аналогічної діючої речовини. Продукт не зареєстрований для цієї культури.

Культура	Мета обробки	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Поля, призначені для посіву с/г культур	Боротьба з однорічними бур'янами	Досходове-післясходове внесення: бур'яни у фазі активного росту, коли вони досягли висоти 10–20 см у фазі 8–12 листків	1 – 4 л/га	1
	Боротьба з багаторічними бур'янами	Досходове-післясходове внесення: на рослину у фазі активного росту, або восени, коли поживні речовини активно споживаються		1