

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



МЕЗОГЕН

СЕЛЕКТИВНИЙ СИСТЕМНИЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

мезотріон – 480 г/л

Хімічна група: Трикетони

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Контролює широкий спектр дводольних та деяких однорічних злакових бур'янів
- Має ґрунтову дію, завдяки чому впливає на другу хвилю бур'янів
- Перешкоджає виникненню резистентності до препаратів із групи сульфоніл сечовин
- Ефективно контролює перерослі бур'яни
- Забезпечує період захисної дії – від 40 до 60 днів

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Амброзія полинолиста	● ● ●	Ріпакова падалиця	● ● ●
Галінсога дрібноквітова	● ● ●	Суріпиця звичайна	● ● ●
Гірчиця польова	● ● ●	Щириця (види)	● ● ●
Горець почечуйний	● ● ●	Соняшникова падалиця	● ● ○
Дурман	● ● ●	Щавель	● ● ○
Зірочник середній	● ● ●	Берізка польова	● ●
Жовтець польовий	● ● ●	Гірчак звичайний (спориш)	● ●
Канатник Теофраста	● ● ●	Куряче просо	● ●
Лобода (види)	● ● ●	Росичка	● ●
Лопух звичайний	● ● ●	Хвощ польовий	● ●
Паслін чорний	● ● ●	Гірчак березковидний	● ○
Пікульник звичайний	● ● ●	Переліска однорічна	● ○
Портулак городній	● ● ●	Підмаренник чіпкий	● ○
Редька біла	● ● ●	Мишій сизий	●
Редька польова	● ● ●	Осот	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні – від +12 до +25°C
- Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18–22 год.)
- Дозволяється пересів кукурудзи по кукурудзі навесні
- Дозволяється восени сіяти озиму пшеницю, озимий ячмінь та озимий ріпак при проведенні обробки ґрунту на глибину 15 см
- Дозволяється після застосування продукту висівати соняшник, сою, сорго, ріпак та люцерну, але обов'язковою умовою є обробіток ґрунту – оранка
- Через 18 місяців після застосування продукту дозволяється висівати цукровий буряк, горох, нут та овочі
- Не застосовувати на посівах кукурудзи, насіння якої оброблено інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук
- Не рекомендовано використовувати інсектициди на основі фосфорорганічних сполук і тіокарбонатів за 7 днів ДО або ПІСЛЯ застосування препарату
- Не рекомендовано змішувати з мікроелементами, зокрема з цинком у будь-якій формі
- Для досягнення рівномірного і достатнього обприскування рекомендуємо додавати прилипач ОіЛАД Плюс у нормі 0,3–0,5 л/га

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	У фазі від 3 до 8 листків кукурудзи включно	0,2 л/га + ПАР	1
		У випадку збільшення норми – зважати на наступну культуру у сівозміні, технологію обробітку ґрунту і кількість опадів	