

ГЕРБИЦИД



НАУТІУС

КОНТРОЛЬ ОДНО- ТА
БАГАТОРІЧНИХ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ
У ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ



ТАРА: 500 г

Діюча речовина:

тифенсульфурон-метил – 400 г/кг

трибенурон-метил – 150 г/кг

Хімічна група: Сульфоніл-сечовини

Формуляція: Водорозчинні гранули (ВГ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Володіє високою селективністю до культури
- Має широке вікно застосування
- Ефективно працює, починаючи від температури +5°C
- Не має обмежень у сівозміні
- Ефективний проти проблемних бур'янів (підмаренника, лободи, щириці, падалиці ріпаку і соняшника) та пригнічує метлюг звичайний

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

- Мають швидкий період напіврозпаду, завдяки чому відсутні будь-які обмеження щодо сівозміни з висіванням наступних культур: ріпаку озимого, кукурудзи, соняшника, сої та ін.
- Якщо зернові, що були оброблені препаратом, загинули від несприятливих умов – пересівання слід проводити лише ярими зерновими культурами

Видимі симптоми ураження: з'являються через 5–8 днів, а повна загибель бур'янів настає через 10–25 днів. Тепла і волога погода підвищує швидкість дії препарату, а прохолодна і суха – уповільнює її.

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Бромус	○	Мак	● ● ●
Вівсюг	○	Волосняк розсічений	● ● ●
Метлиця	●	Хрестоцвіті	● ● ●
Райграс	○	Гірчак	●
Тонконіг	○	Яснотка	● ● ●
Підмаренник чіпкий	● ●	Лобода	● ●
Волошка	●	Щириця	●
Вероніка	● ●	Пирій повзучий	○
Ромашка	● ● ●	Берізка польова	○
Зірочник	● ● ●	Осот	● ●
Братики	● ●	Хвощ	○

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Для максимальної ефективності продукту рекомендовано вносити його, коли бур'яни знаходяться в активному рості на ранніх фазах розвитку: **однорічні дводольні бур'яни** – 2–6 листків; **амброзія полинолиста** – до 2 листків; **підмаренник чіпкий** – до 3 кілець; **багаторічні бур'яни** – фаза розетки; **гірчиця польова, мак дикий та ромашка польова** – можуть контролюватися на більш пізніх фазах
- Продукт можна використовувати у якості партнера у бакових сумішах
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність
- Для досягнення рівномірного і достатнього обприскування рекомендуємо використовувати разом з адювантом **ОіЛАД Плюс у нормі 0,35–0,5 л/га**

Культура	Фаза внесення	Норма витрати
Пшениця	Від початку кущення до прапорцевого листка (BBCH 21–39)	60 – 70 г/га
*Ячмінь	Від початку кущення до прапорцевого листка (BBCH 21–39)	60 – 70 г/га

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури