

РІДКЕ ЛИСТОВЕ ДОБРИВО

FERTEQ



НітроТОП

АЗОТНЕ ДОБРИВО
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ВМІСТУ БІЛКА У ЗЕРНІ



ТАРА: 10 л

Склад:

Азот (N) – 300 г/л

Сірчаний ангідрид (SO_3) – 67 г/л

Оксид магнію (MgO) – 33 г/л

pH продукта: 8,2

Густина продукта: 1,27



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Містить азот з пролонгованою дією, а також магній і сірку
- Призначений для задоволення потреби в азоті та довгострокового живлення рослини
- Оптимізовує вміст білка у зерні, покращує якість врожаю і дозволяє поверхні рослини засвоїти більше азоту, ніж у простій формі карбаміду
- Виступає в якості доповнення, або заміни останнього внесення азотних добрив
- У випадку посушливих умов – гарантує доступність азоту, на відміну від стандартних добрив
- Забезпечує правильне поєднання азоту, магнію і сірки
- Дозволяє зменшити втрати азоту через випаровування
- Покращує здатність всмоктування поживних речовин поверхню листка

ТРИВАЛЕ І ПОСЛІДОВНЕ ЖИВЛЕННЯ

Продукт містить відмінне поєднання ключових поживних речовин, що гарантує ефективне поглинання листками, дозволяє уникнути утворення кристалів і знижує ризик опіків на листках

N АЗОТ


Основа процесу наливу зерна і рушійна сила синтезу білків. Він оптимізовує фотосинтез, підтримуючи виробництво хлорофілу та безпосередньо впливає на кількість і якість врожаю.

Mg МАГНІЙ

Центральний компонент молекули хлорофілу, що відіграє ключову роль у фотосинтезі. Він сприяє енергетичним процесам у рослині та покращує фотосинтез.

S СІРКА

Необхідний елемент для синтезу амінокислот і білків, що має вирішальний вплив на врожайність культури і якість зерна.



Лігно-сульфонати

Продукт містить природні комплексо-утворюючі речовини, екстраговані з деревини, що мають хелатні та адитивні властивості. **Використання цієї технології гарантує, що більш, як 90% елементів, які використовуються, будуть поглинуті рослиною.**

Лігно-сульфонати забезпечують краще розсіювання крапель, збільшення контактної поверхні на листку, а також перешкоджають кристалізації і сприяють підвищеній стійкості до вилугування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Кількість внесення
Зернові	ВВСН 45–59	10 – 20 л/га	1
Ріпак	ВВСН 51–61	10 л/га	1–2
Соняшник	ВВСН 12–33	15 – 20 л/га	1
Кукурудза	ВВСН 14–51	15 – 20 л/га	1–2