

ГЕРБІЦИД



РАФАЛЬ

ҐРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД
ПРОТИ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ
І ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

кломазон – 480 г/л

Хімічна група: Ізаксолідини

Формуляція: Концентрат емульсії (КЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має довготривалий захисний екран
- Ефективність його внесення мінімально залежить від вологості ґрунту
- Має високу біологічну ефективність на усіх типах ґрунтів
- Ефективний проти підмаренника чіпкого і лободи
- Не потребує заробки у ґрунт

КЛОМАЗОН

- Проникає у рослину через корені та колеоптиле і рухається ксилемою виключно вгору до листя, де блокує синтез хлорофілу, у результаті чого відбувається відбілювання та відмирання бур'янів
- Поглинається переважно молодими пагонами (гіпокотиллями і колеоптилями) та корінням
- За механізмом дії відноситься до інгібіторів синтезу пігментів і застосовується проти однорічних дводольних та злакових бур'янів на ріпаку і сої
- Забезпечує ефективний захист навіть при невеликій вологості ґрунту
- Є хорошим партнером для покращення спектру дії на широколистяних бур'янах
- У культурних рослинах включається у метаболізм та розкладається до нетоксичних речовин

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Вівсюг	• •	Росичка	• •
Куряче просо	• •	Падалиця соняшника	• •
Лисохвіст	• •	Паслін чорний	• •
Лобода	• •	Щириця звичайна	• •
Метлиця	• •	Гірчак	•
Мишій сизий	• •	Гірчак беззакоридний	•
Підмаренник чіпкий	• •	Гірчак звичайний	•
Вероніка	•	Зірочник	•
Волошка польова	•	Осот	•
Грицики	•	Падалиця зернових	•
Мак	•	Падалиця ріпаку	•
Райграс	•	Переліска однорічна	•
Ромашка	•	Хрестоцвіті	•
Талабан	•		

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Рекомендуємо підбирати дозу внесення під тип ґрунту
- На сої радимо використовувати препарат із додаванням партнера
- **Світовий досвід застосування діючої речовини дозволяє вносити препарат післясходово у нормі 0,25 – 0,5 л/га у фазі 1–3 трійчатих листки у сої**
- Не радимо на посівах, що були оброблені препаратом, висівати восени або навесні наступні культури: пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу на зерно та люцерну
- Період напіврозпаду препарату у ґрунті: 15–45 днів, залежно від типу ґрунту

Культура	Фаза внесення	Норма витрати
Ріпак	До сходів	0,15 – 0,2 л/га
Соя	До сходів	0,15 – 0,2 л/га