


НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ФУНГІЦИД



РОДОЛІТ Супер

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД
ДЛЯ БОРОТЬБИ
ІЗ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ХВОРОБ



ТАРА: 10 л

Діюча речовина:

тебуконазол – 250 г/л

Хімічна група: Триазоли

Формуляція: Емульсія, олія у воді (ЕВ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має профілактичну лікувальну та викорінюючу дію проти широкого спектру патогенів
- Швидко проникає у рослину і рівномірно розподіляється у ній, забезпечуючи тривалий захист культури
- Має яскраво виражений стоп-ефект
- В осінній період може використовуватися як регулятор росту для ріпаку, що забезпечує вдалу перезимівлю культури
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Не викликає фітотоксичності
- Стійкий до змивання дощем

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні - від +15 до +25°C
- Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18–22 год.) за швидкості вітру не більше 3 м/с при дрібно-крапельному і 4 м/с при крупно-крапельному обприскуванні
- Норма витрати робочого розчину – 100–300 л/га
- Не рекомендований до застосування пізніше, ніж за 30 діб до початку збору врожаю зернових та 50 діб до початку збору врожаю ріпаку
- Не рекомендований для змішування з препаратами, що мають кислу або лужну реакції
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність та фіто-токсичність відносно культури, яка обробляється

Культура	Хвороби, проти яких обробляється	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима і яра	Септоріоз, Іржа, Гельмінтоспоріоз, Фузаріоз колоса, Септоріоз колоса	Від початку кушення до кінця колосіння	0,5 – 1 л/га	2
Ріпак ярий	Альтернاریоз, Циліндроспоріоз, Фомоз	За висоти рослини 20–30 см	0,5 – 1 л/га	2
Ріпак озимий		Восени: у фазі 3–7 листків культури Весною: за висоти рослин 15–20 см		
Ріпак озимий	Інгібування росту листя і підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	Восени: у фазі 4–5 листків культури	0,5 – 0,75 л/га	1
*Ячмінь ярий	Сітчаста плямистість, Темно-бура плямистість, Іржа	Обприскування під час вегетації	0,5 – 1 л/га	1–2
*Цукровий буряк	Церкоспороз, Іржа, Рамуляріоз, Фомоз	Обприскування під час вегетації	0,5 – 1 л/га	2
*Соя	Септоріоз, Аскохитоз, Альтернاریоз, Іржа, Антракноз	Обприскування під час вегетації	0,5 – 1 л/га	2
*Соняшник	Фомоз, Фомопсис, Альтернاریоз	Обприскування під час вегетації	0,5 – 0,75 л/га	1–2

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.