

НітроТОП

FERTEQ



ЛИСТОВЕ ДОБРИВО НА ОСНОВІ АЗОТУ У ПОЄДНАННІ З СІРКОЮ ТА МАГНІЄМ, ЯКЕ ОПТИМІЗУЄ ВМІСТ БІЛКА У ЗЕРНІ, ПОКРАЩУЄ ЯКІСТЬ УРОЖАЮ ТА МАЄ ПРОЛОНГОВАНУ ДІЮ ЗА РАХУНОК АЗОТУ У ДВОХ РІЗНИХ ФОРМАХ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №04455, Серія Б

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація, %	Вміст елементів, г/л
Загальний азот (N) 15,4% амідний, 7,7% азот з формальдегідом-сечовини	23,1 %	300 г/л
Водорозчинний оксид магнію (MgO)	2,5 %	33 г/л
Водорозчинний триоксид сірки (SO ₃)	5,2 %	67 г/л



12,8 кг(kg)

10 л(L)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Норма витрати препарату	Рекомендований об'єм води	Період обробки
Листове підживлення:			
Зернові	15–20 л/га	100 л мін.	Від пророщеного листка до цвітіння.
Кукурудза	15–20 л/га	200 л	Від 4 – 6 листків і через 10 – 15 днів, якщо є потреба
Картопля	10–20 л/га	200 л	Перед початком формування бульб і на початку стадії цвітіння.
Буряк	10–20 л/га	100 л мін.	На стадії 4-6 листків і через місяць, якщо є потреба.
Соняшник	15–20 л/га	100 л мін.	Від 5-6 пар листків до появи суцвіття.
Кормовий буряк	10–20 л/га	100 л мін.	Від 4-6 листків і через 1 місяць, якщо потрібно.
Хрестоцвітні	15–20 л/га	100 л мін.	Від 4-8 листків, потім на стадії (C1) і на стадії (D2). ● Посилене підживлення – 2 внесення від стадії нерозкритих листків до стадії. ● Для покращення якості суцця – 2 внесення навколо лози з інтервалом у 15 днів. ● Після збирання: 1 внесення після збору урожаю і до початку опадання листів.
Виноград	5–10 л/га 20 л/га 5–10 л/га	200 л 200 л 200 л	● Азотна підтримка – 1 внесення до стадії цвітіння, або 1 внесення до початку цвітіння або після опадання листю. ● Після збирання: 1 внесення після збору урожаю і перед початком опадання листя.
Фруктові дерева	5–10 л/га 5–10 л/га	500 л 500 л	

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 1. Збовтайте каністру перед використанням. 2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на $\frac{3}{4}$ від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). 4. Змішуйте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскування у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та безпеки. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються). Не застосовувати під час цвітіння. При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутися за консультацією до агрономів відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 40 °C.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Дopusкається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидати в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явленні рекомендацій щодо використання дозування для кожної культури. За будь-які ризики, пов'язані зі збиранням, маніпулюванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутися до лікаря. При ускладненому диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротову порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Упаковка: 10 л, 200 л, 600 л

Термін зберігання: 36 місяців

Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по BOO3, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки

Виробник: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France; тел.: +33 (0)561.978.500, www.agronutrition.com

Імпортер та дистриб'ютор в Україні: ТОВ «Суффле Агро Україна»,

вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутиський р-н,

Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua.

тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

