

ПРОТРУЙНИК



СІДФОРТ ТОП

ІНСЕКТО-ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК
СИСТЕМНОЇ ДІЇ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

тіаметоксам – 262,5 г/л

дифеноконазол – 25 г/л

флудіоксоніл – 25 г/л

Хімічна група: Неонікотиніди,

Триазолі,

Фенілпіроли

Формуляція: Текучий концентрат (ТН)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Універсальний протруйник з високою ефективністю і тривалим періодом захисної дії
- Є готовою композицією, що поєднує фунгіцидні та інсектицидні компоненти
- Забезпечує профілактичну і лікувальну дію проти широкого спектру збудників хвороб

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура продукту і води для застосування – 10–35°C
- Не рекомендовано використовувати продукт і воду з температурою нижче 10°C
- Для протруювання використовувати добре очищене насіння для того, щоб уникнути зниження ефективності препарату через зайвий пил та домішки
- Робочий розчин використати у день його приготування
- Продукт сумісний з інокулянтами
- Продукт сумісний з іншими препаратами, за винятком тих, що мають олійну основу
- Перед використанням з іншими ЗЗР обов'язково перевіряти компоненти суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати	Спосіб, час обробки та обмеження	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Летюча, тверда і карликова сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, альтернаріоз, пліснява насіння	1,5 – 2 л/т	Протруювання перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
	Озима совка, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки			
Ячмінь ярий *Ячмінь озимий	Летюча і кам'яна сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість, септоріоз	1,5 – 2 л/т	Протруювання перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
	Озима совка, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, п'явиці, цикадки			
*Жито озиме	Фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, пліснява насіння	1,4 – 1,5 л/т	Протруювання перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
	Попелиці, цикадки, злакові мухи			
Соя	Фузаріоз, аскохітоз	0,75 – 1 л/т	Протруювання перед посівом: 4–6 л води на 1 т насіння	1
	Ґрунтові шкідники			
Картопля	Ризоктоніоз, альтернаріоз, парша срібляста і звичайна, фузаріоз	0,5 – 0,7 л/т	Обробка бульб за 12–48 годин до висаджування або при садінні: 10–20 л води на 1 т бульб	1
	Дротяники, личинки хрущів, капустянки, насправжньо-дротяники, попелиці, колорадський жук			

* Світовий досвід використання аналогічної діючої речовини. Продукт не зареєстрований для цієї культури.