

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



СУФФІМ

ПРОДУКТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ПРОТИ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ СОНЯШНИКА,
СТІЙКОГО ДО ІМІДАЗОЛІНОНІВ



ТАРА: 10 л

Діюча речовина:

імазамокс – 33 г/л

імазапір – 15 г/л

Хімічна група: Імідазолінони

Формуляція: Розчинний концентрат (РК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Забезпечує проникнення діючої речовини, як через листя, так і через кореневу систему бур'янів
- Однаково ефективно контролює злакові і дводольні бур'яни
- Дозволяє проводити одну обробку протягом всього вегетаційного періоду культури
- Ефективно діє, незалежно від кількості опадів
- Дозволяє використання у різних системах обробки ґрунту (Mini-Till, No-Till)

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

- Імазамокс та імазапір впливають на синтез амінокислот, що відбувається у хлоропластах, шляхом зв'язування ензиму ацетолактатсинтази. Це призводить до дефіциту незамінних амінокислот: ізолейцину, лейцину та валіну.
- За достатнього рівня зволоження ґрунту володіють частковою ґрунтовою дією, абсорбуються також і корінням. Проте, основна частина препарату поглинається листям і швидко переміщується до місць найбільшої меристематичної активності – точок росту. У результаті цього через кілька годин припиняється поділ клітин, зупиняється ріст пагонів та кореневої системи, а через 2–3 тижні настає повна загибель.

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Амброзія полинолиста	● ● ●	Спориш звичайний	● ● ●
Вероніка (види)	● ● ●	Талабан польовий	● ● ●
Вівсюг звичайний	● ● ●	Тонконіг (види)	● ● ●
Вовчок соняшниковий	● ● ●	Щириця (види)	● ● ●
Герань	● ● ●	Ріпакова падалиця	● ●
Гірчак (види)	● ● ●	Зернова падалиця	● ●
Галінсога дрібноквітова	● ● ●	Берізка польова	● ●
Зірочник	● ● ●	Бромус	● ●
Кучерявець Софії	● ● ●	Куряче просо	● ●
Лобода (види)	● ● ●	Мак дикий	● ●
Метлюг звичайний	● ● ●	Молочай (види)	● ●
Мишій (види)	● ● ●	Волошка синя	●(●)
Осот	● ● ●	Пирій повзучий	●(●)
Паслін чорний	● ● ●	Ромашка (види)	●(●)
Переліска однорічна	● ● ●	Росичка	●
Підмаренник чіпкий	● ● ●	Щавель (види)	●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Рекомендовано вносити під час активної вегетації бур'янів: для злакових – фаза 2-3 листки, для однорічних дводольних – фаза сім'ядоль - 2-4 листки, для багаторічних – за висоти до 15 см
- Оптимальна температура внесення +15...+25°C, відносна вологість повітря від 65%, швидкість вітру – не більше 5 м/с у ранкові або вечірні години
- У більшості випадків не рекомендований до застосування у бакових сумішах з іншими гербіцидами
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соняшник	4 справжніх листки культури	1 – 1,2 л/га	1