


НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

ФУНГІЦИД



СТАРПРО

ВИСОКО-КОНЦЕНТРОВАНИЙ ФУНГІЦИД
ІЗ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

тебуконазол – 430 г/л

Хімічна група: Триазоли

Формуляція: Концентрат суспензії (КС)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має широкий спектр дії зі швидким стоп-ефектом
- Не проявляє фіто-токсичності на різних стадіях розвитку культури
- Швидко проникає у рослину та рівномірно поширюється ксилемою
- Малотоксичний для бджіл, дощових черв'яків, птахів та гризунів

ТЕБУКОНАЗОЛ

- Поглинається листям і стеблами рослини та системно розподіляється потоком транспірації на усю рослину
- Пригнічує біосинтез ергостеролу, попереджає утворення клітинних мембран патогену
- Гарантує ефективний захист проти фомозу, борошнистої роси, циліндроспоріозу та альтернаріозу

На посівах ріпаку препарат є одним з найкращих морфо-регуляторів при застосуванні восени і навесні. Інгібує розвиток центрального пагона, стимулює розвиток бокових пагонів. Також стимулює розвиток кореневої системи, покращуючи засвоєння поживних речовин та перезимівлю культури.

Рекомендовано не знижувати норму застосування продукту і за потреби використовувати його у бакових сумішах разом з партнером для уникнення резистентності.

Формуляція SC з високою концентрацією дозволяє:

- Обробити більшу площу меншою кількістю літрів
- Зменшити витрати на транспортування і заощадити час на заправку обприскувача
- Зменшити кількість відходів упаковки для утилізації
- Ідеально поєднувати продукт з іншими пестицидами у бакових сумішах



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Зернові	BBCH 21–30 BBCH 59–69	0,3 – 0,6 л/т	2
Ріпак	BBCH 16 BBCH 32	0,3 – 1 л/т	2
*Соя	BBCH 14–65	0,3 – 0,6 л/т	
*Цукровий буряк	BBCH 18–49	0,3 – 0,6 л/т	

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.