

РЕГУЛЯТОР РОСТУ



КОНТРОЛЬ ВЕГЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ

ТРІНЕКСОН

РЕГУЛЯТОР РОСТУ,
ЩО ЗАПОБІГАЄ ВИЛЯГАННЮ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

трінексапак-етил – 250 г/л

Хімічна група: Циклогександіони

Формуляція: Концентрат емульсії (КЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:


- Посилює стійкість стебла до вилягання за рахунок скорочення довжини міжвузлів і потовщення стінок стебла
- Впливає на кількість пагонів – зменшує недорозвинені пагони
- Збільшує коефіцієнт кущення, вирівнює посів і забезпечує його щільність
- Має період дії від 12 до 20 днів
- Діє на усі міжвузля рослини, які ростуть, а не тільки на те, на яке його внесено



Вибір та внесення регулятора залежить від кількості опадів, часу відновлення весняної вегетації, сорту, попередника, використання добрив і температури повітря.


Для кращої стійкості до вилягання рослина повинна бути оптимально забезпечена поживними речовинами: фосфором, калієм, бором, міддю, марганцем тощо.

Використання регуляторів росту за стресових умов ЗАБОРОНЕНО!



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні від +6 до +22°C
- Максимальна ефективність продукту залежить від температури і сонячної погоди, протягом наступних 5-8 днів після внесення – чим більше сонця, тим краще



Культура	Спосіб і час обробки	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Ячмінь ярий	Обприскування від фази кущення та виходу у трубку до фази появи прапорцевого листка	0,4 – 0,6 л/га	1
Пшениця озима	Обприскування від фази кущення та виходу у трубку до фази появи прапорцевого листка	0,4 – 0,6 л/га	1