


НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБІЦИД



ТАСКОН

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ
ВІД ЗЛАКОВИХ І ДЕЯКИХ
ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ТАРА: 720 г

Діюча речовина:

нікосульфурон – 750 г/кг

Хімічна група: Сульфонілсечовини

Формуляція: Водорозчинні гранули (ВГ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Має широкий спектр дії на злакові бур'яни, у т.ч. на пирій, гумай, метлюг та вівсюг
- Забезпечує якісну системність – знищує кореневу систему бур'янів
- Має високу селективність щодо культури, незалежно від фази застосування (3–10 листків)
- Не має післядії на наступні культури
- Дозволяє низьку норму використання і має широке вікно застосування
- Зручний у логістиці та зберіганні завдяки препаративній формі і високій концентрації діючої речовини

НІКОСУЛЬФУРОН

- Проникає у рослину через листя, стебла і корені та швидко пересувається по рослині до точок росту
- Пригнічує активність ферментів ацетолактатсинтази (ALS) та синтази ацетогідроксикислоти (AHAS), у результаті чого порушується синтез амінокислот валіну, лейцину та ізолейцину, що призводить до припинення поділу клітин і росту рослини

Бур'ян	Ефективність
Вівсюг звичайний	● ● ●
Стоколос (види)	● ●
Тонконіг однорічний	● ●
Гумай	● ●
Лисохвіст польовий	● ● ●
Метлюг звичайний	● ● ●
Мишій зелений	● ● ●
Мишій сизий	● ● ●
Пирій повзучий	● ● ●
Плоскуха звичайна	● ●
Райграс (до кущення)	● ● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Застосовувати під час активної вегетації бур'янів: для однорічних злакових видів – у фазі 3–4 листки, для багаторічних – за висоти до 10–15 см, для однорічних дводольних – у фазі сім'ядоль – 2–4 листки
- Оптимальна температура внесення +15...+25°C, відносна вологість повітря від 65%, швидкість вітру – не більше 5 м/с у ранкові або вечірні години
- При випаданні значної кількості опадів упродовж 10 днів після обприскування – можливе повторне відростання кореневої системи злакових бур'янів, що може призвести до зниження ефективності продукту
- **Для забезпечення найкращого результату застосовувати разом з прилипачем ОілАД Плюс у нормі 0,35–0,5 л/га**
- Не рекомендовано застосовувати, коли бур'яни перебувають у стресовому стані (перепади денних і нічних температур, тривала повітряна і ґрунтова посуха), оскільки при уповільненому метаболізмі знижується швидкість переміщення діючих речовин
- Для кращого контролю дводольних бур'янів рекомендовано додавати продукти на основі дікамби та мезотріону
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Фаза внесення	Норма витрати
Кукурудза	У фазі від 3 до 10 листків (BBCH 12–19)	40 – 80 г/га