

ІНСЕКТИЦИД



ВЕГА

ІНСЕКТИЦИД
СИСТЕМНО-КОНТАКТНОЇ ДІЇ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

тіаметоксам – 141 г/л

лямбда-цигалотрин – 106 г/л

Хімічна група: Неонікотиноїди, піретроїди

Формуляція:

Концентрат суспензії (КС) – тіаметоксам

Капсульна суспензія (СК) – лямбда-цигалотрин

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Ефективний проти дуже широкого спектру шкідників, незалежно від погодних умов
- Забезпечує швидкий стоп-ефект та ефективний контроль шкідників протягом тривалого часу
- Містить капсульований лямбда-цигалотрин, який є захищеним від ультрафіолетового випромінювання і стабільним у широкому діапазоні рН, що вдвічі продовжує тривалість захисної дії і дає можливість контролювати шкідників на різних фазах їхнього розвитку
- Завдяки двом діючим речовинам із різних хімічних груп, дозволяє уникнути резистентності

Культура	Шкідник	Ефективність
Зернові	Елія гостроголова	● ● ●
	Клоп шкідлива черепашка	● ● ●
	Попелиця	● ● ●
	Пшеничний трипс	● ● ●
	П'явиця	● ● ●
	Хлібні блішки	● ● ●
	Цикадка	● ●
	Злакова муха	● ●
	Хлібна жужелиця - турун (личинки молодшого віку)	● ●
	Хлібний жук	● ●
Соняшник	Ячмінний мінер	● ●
	Попелиці	● ● ●
	Тютюновий трипс	● ● ●
Цукровий буряк	Сірий довгоносик	● ●
	Блішка	● ● ●
	Звичайний буряковий довгоносик	● ● ●
	Листкова бурякова попелиця	● ● ●
*Горох	Сірий буряковий довгоносик	● ●
	Булбочкові довгоносики	● ● ●
	Горохова попелиця	● ● ●
	Горохова зернівка (брухус)	● ●

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні – від +8°C до +25°C
- Оптимальна температура продукту і води для застосування – 10–35 °C (при нижчій температурі потрібно забезпечити ретельне струшування і змішування робочого розчину)
- Не рекомендовано застосовувати продукт в екстремальних погодних умовах, або коли шкідники не є активними
- Не рекомендовано застосовувати під час цвітіння культури та активного льоту бджіл
- Продукт можна використовувати в якості партнера у бакових сумішах
- Перед використанням з іншими ЗЗР обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	ВВСН 13–69	0,18 – 0,4 л/га	2
Ячмінь ярий	ВВСН 13–69	0,18 – 0,22 л/га	1
*Ячмінь озимий	ВВСН 13–69	0,18 – 0,22 л/га	2
Соняшник	ВВСН 12–51	0,18 л/га	2
Цукровий буряк	ВВСН 10–39	0,18 л/га	2
*Горох	ВВСН 51–69	0,18 л/га	2

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.