

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



ВІНЕС

ПРОДУКТ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ
СОЇ І СОНЯШНИКА



ТАРА: 10 л

Діюча речовина:

імазамокс – 40 г/л

Хімічна група: Імідазолінони

Формуляція: Розчинний концентрат (РК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Ефективно контролює широкий спектр однорічних дводольних і злакових бур'янів
- Попереджає сходи наступної хвилі бур'янів – має яскраво виражену ґрунтову дію
- Дозволяє обмежитися однією обробкою протягом вегетаційного періоду культури (за умови дотримання усіх рекомендацій щодо внесення)

Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність	Бур'ян	Ефективність
Амброзія полинолиста	● ● ●	Метлюг звичайний	● ● ●	Підмаренник чіпкий	● ● ○
Вероніка (види)	● ● ●	Мишій (види)	● ● ●	Гірчак звичайний	● ● ○
Вівсюг звичайний	● ● ●	Незабудка польова	● ● ●	Берізка польова	● ●
Вовчок соняшниковий	● ● ●	Нетреба звичайна	● ● ●	Бромус (види)	● ●
Галінсога	● ● ●	Осот городній	● ● ●	Волошка синя	● ●
Герань (види)	● ● ●	Осот жовтий	● ● ●	Гірчак березковидний	● ●
Гібіскус трійчастий	● ● ●	Паслін чорний	● ● ●	Жовтець польовий	● ●
Гірчак почечуйний	● ● ●	Петрушка собача	● ● ●	Зернова падалиця	● ●
Гірчиця польова	● ● ●	Редька дика	● ● ●	Куряче просо	● ●
Грицики звичайні	● ● ●	Рутка лікарська	● ● ●	Лобода (види)	● ●
Дурман звичайний	● ● ●	Свербіга східна	● ● ●	Падалиця соняшника	● ●
Зірочник середній	● ● ●	Спориш звичайний	● ● ●	Падалиця ріпаку	● ●
Канатник Теофраста	● ● ●	Суріпиця звичайна	● ● ●	Переліска однорічна	● ●
Кропива глуха і жалка	● ● ●	Талабан польовий	● ● ●	Ромашка (види)	● ●
Курячі очка	● ● ●	Тонконіг (види)	● ● ●	Росичка	● ●
Кучерявець Софії	● ● ●	Череда трироздільна	● ● ●	Фіалка (види)	● ●
		Чистець польовий	● ● ●	Щавель	● ●
		Щириця (види)	● ● ●		

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні +14...+25°C
- Не рекомендовано використовувати у бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами
- Не рекомендовано використовувати з інсектицидами фосфор-органічної групи
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність
- Не рекомендовано використовувати під час стресових умов культури: дефіцит елементів живлення, погодні умови, пригнічення пестицидами тощо
- Не рекомендовано використовувати на одному полі частіше, ніж 1 раз протягом 3-х років

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соя	1–3 трійчастих листки культури Злакові бур'яни – у фазі 1–3 листки Дводольні бур'яни – у фазі 2–4 листки	0,75 – 1 л/га	1
		У бакових сумішах: 0,3 – 0,35 л/га	
Соняшник (сорт і гібриди, стійкі до імідазолінів)	2–8 листків культури на ранніх етапах розвитку бур'янів	1 – 1,2 л/га	1